




ಐಸಿಎಆರ್ ಜೆಎಸ್‌ಎಸ್
ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ, ಸುತ್ತೂರು



ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಗಳು



ಲೇಖಕರು

ಶ್ರೀ ಶಾಮರಾಜ್

ಶ್ರೀಮತಿ ಹೆಚ್. ಎ. ದಿವ್ಯಾ

ಶ್ರೀಮತಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಎತ್ತಿನಮನಿ



ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು

ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಆಹಾರವೆಂದು ಕರೆಯುವರು. ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಆಹಾರದಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಸಾರಜನಕ (ಪ್ರೋಟೀನ್) ಅಂಶವು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಇದು ದಿನದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ 1 ಗ್ರಾಂ ಸಸಾರಜನಕ 4 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರಿಯಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಹಾರದಲ್ಲ ಶೇ 25-30ರಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ದೊರಕಬೇಕು. ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಮೊಳಕೆಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳ (ಜೀವಸತ್ವ ಸಿ ಮತ್ತು ಬಿ) ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಚನವಾಗುತ್ತವೆ.

ಪ್ರತಿ 100 ಗ್ರಾಂ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮೋಷಕಾಂಶಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಮೋಷಕಾಂಶಗಳು	ಉದ್ದು	ಅಲಸಂದೆ	ಹೆಸರು	ಕಡಲೆ	ಅವರೆ	ಮರುಳ	ತೋಗರಿ
ಶಕ್ತಿ (ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರಿ)	347	323	334	360	347	321	365
ಪ್ರೋಟೀನ್ (ಗ್ರಾಂ)	24	24.10	24	17.10	24.90	22	22.30
ಕೊಬ್ಬು (ಗ್ರಾಂ)	1.40	1.00	1.30	5.30	0.80	0.50	1.70
ನಾರು (ಗ್ರಾಂ)	0.90	3.80	4.10	3.90	1.40	5.30	4.80
ಶರ್ಕರಾಂಶ (ಗ್ರಾಂ)	59.60	54.50	56.70	60.90	60.10	57.20	60.60
ಖನಿಜ(ಗ್ರಾಂ)	3.20	3.20	3.50	3.00	3.20	3.20	3.50
ಸುಣ್ಣ (ಮಿ.ಗ್ರಾಂ)	154	77	124	202	60	287	260
ಕಬ್ಬಿಣ (ಮಿ.ಗ್ರಾಂ)	3.80	8.60	4.40	4.6	2.70	6.77	5.10

ಉದ್ದು

ತಳ: ೮೨

ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ: 85-90 ದಿನಗಳು

ಬತ್ತನೆ ಕಾಲ: ಏಪ್ರಿಲ್-ಮೇ

ವಿಶೇಷತೆ: ನೀರಾವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾದ ತಳ

ಇಳುವರಿ: ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಋಷ್ಣಿ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲ ಎಕರೆಗೆ 2.5-3 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್‌ನಷ್ಟು ಹಾಗೂ ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ 4-5 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್‌ನಷ್ಟು ಕಾಳನ ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ತಳ: ಎಲ್‌ಬಿಜಿ-791

ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ: 70-75 ದಿನಗಳು

ಬತ್ತನೆ ಕಾಲ: ಮೇ-ಜೂನ್

ವಿಶೇಷತೆ: ಹಳದಿ ಎಲೆ ರೋಗ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ
ಇಳುವರಿ: ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಋಷ್ಣಿ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲ ಎಕರೆಗೆ 3-4 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್‌ನಷ್ಟು ಹಾಗೂ ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ 5-6 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್‌ನಷ್ಟು ಕಾಳನ ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.



ತಳ: ನಿರ್ಮಲ

ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ: 70-75 ದಿನಗಳು

ಬತ್ತನೆ ಕಾಲ: ಮೇ-ಜೂನ್

ವಿಶೇಷತೆ: ಹಳದಿ ಎಲೆ ರೋಗ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ.

ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ತಳ

ಇಳುವರಿ: ಋಷ್ಣಿ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 3-4 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್‌ನಷ್ಟು ಹಾಗೂ ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ 5-6 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್‌ನಷ್ಟು ಕಾಳನ ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ತಳ: ಎಲ್‌ಬಿಜಿ-625

ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ: 70-75 ದಿನಗಳು

ಬತ್ತನೆ ಕಾಲ: ಜನವರಿ-ಫೆಬ್ರವರಿ

ವಿಶೇಷತೆ: ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ತಳ

ಇಳುವರಿ: ಋಷ್ಣಿ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 4.0-4.5 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್‌ನಷ್ಟು ಹಾಗೂ ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ 6-7 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್‌ನಷ್ಟು ಕಾಳನ ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ತಳ: ಎಲ್‌ಬಿಜಿ-625 ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ: 70-75 ದಿನಗಳು

ಬತ್ತನೆ ಕಾಲ: ಜನವರಿ-ಫೆಬ್ರವರಿ

ವಿಶೇಷತೆ: ಎತ್ತರದ ಗಿಡಗಳು ಹಾಗೂ ಹೊಳೆಯುವ ಕಾಳುಗಳು
ಇಳುವರಿ: ಋಷ್ಣಿ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 4.0-4.5 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್‌ನಷ್ಟು ಹಾಗೂ ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ 6-7 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್‌ನಷ್ಟು ಕಾಳನ ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ಅಲಸಂದೆ

ತಳ: ಸಿ-152

ಬೆಳೆ ಅವಧಿ: 85 ದಿನಗಳು

ಬತ್ತನೆ ಕಾಲ: ಜೂನ್- ಜುಲೈ

ವಿಶೇಷತೆ: ಕೆಂಪು ಗಟ್ಟಿ ಕಾಳನ ತಳ

ಇಳುವರಿ: ಋಷ್ಣಿ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 3-3.5 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಹಾಗೂ ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 8-10 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್‌ನಷ್ಟು ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ತಳ: ಬಿಳಿ (ಸ್ಥಳೀಯ)

ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ: 75 ದಿನಗಳು ಬತ್ತನೆ ಕಾಲ: ಜೂನ್- ಜುಲೈ

ವಿಶೇಷತೆ: ಬಿಳಿ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಳನ ತಳ

ಇಳುವರಿ: ಋಷ್ಣಿ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 3-3.5 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್‌ನಷ್ಟು ಕಾಳನ ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.



ಕಡಲೆ ಕಾಳು



ತಳಿ: ಜೆಜಿ-11

ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ: 95-100 ದಿನಗಳು

ವಿಶೇಷತೆ: ಬರ ನಿರೋಧಕ ತಳಿ, ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾದ ತಳಿ

ಇಳುವರಿ: ಋಷ್ಣಿ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 4-5 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಹಾಗೂ ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 8-10 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್‌ನಷ್ಟು ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ಅವರೆ



ತಳಿ: ಹೆಜ್ ಎ - 4

ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ: 90-95 ದಿನಗಳು

ವಿಶೇಷತೆ: ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾದ ತಳಿ. ಕಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೊಗಡಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಇಳುವರಿ: ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಯಾಗಿ ಎಕರೆಗೆ 2-2.5 ಟನ್‌ನಷ್ಟು ಅಥವಾ ಎಕರೆಗೆ 2-3 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್‌ನಷ್ಟು ಒಣ ಕಾಳಿನ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ಮರುಳಿ



ತಳಿ: ಕಂದು(ಸ್ಥಳೀಯ)

ಬೆಳೆ ಅವಧಿ: 120 ದಿನಗಳು **ಚಿತ್ರಣ ಕಾಲ:** ಮೇ-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್

ವಿಶೇಷತೆ: ಬರ ನಿರೋಧಕ ತಳಿ

ಇಳುವರಿ: ಏಕ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 3.5-4 ಕ್ವಿ ನಷ್ಟು ಕಾಳಿನ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ಯಾರ್ಡ್ ಲಾಂಗ್ ಬೀನ್

ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ: 60-100 ದಿನಗಳು


ಚಿತ್ರಣ ಕಾಲ: ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು

ವಿಶೇಷತೆ: 70-75 ಸೆ.ಮೀ ನಷ್ಟು ಉದ್ದನೆಯ ಕಾಯಿಗಳು ಐಡುತ್ತದೆ. 60ನೇ ದಿನದಿಂದ 100 ದಿನದವರೆಗೂ


ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ತರಕಾರಿಗೆ ಕಟಾವು ಮಾಡಬಹುದು.

ಇಳುವರಿ: ಏಕ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ

ಎಕರೆಗೆ 10-12 ಟನ್ ನಷ್ಟು ತರಕಾರಿ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು



ಮಡಿಕೆ ಕಾಳು



ತಳ: ಸ್ಥಳೀಯ

ಬೆಳೆ ಅವಧಿ: 90 ದಿನಗಳು

ಐತ್ತನೆ ಕಾಲ: ಮೇ-ಜೂನ್

ವಿಶೇಷತೆ: ಬರನಿರೋಧಕ, ಕಡಿಮೆ ಫಲವತ್ತತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾದ ಬೆಳೆ

ಇಳುವರಿ: ಏಕ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 3.0-5.0 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್‌ನಷ್ಟು ಕಾಳನ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ಮಸೂರು/ಕೇಸರಿ ದಾಲ್

ತಳ: ಸ್ಥಳೀಯ

ಬೆಳೆ ಅವಧಿ: 80-110 ದಿನಗಳು

ಐತ್ತನೆ ಕಾಲ: ನವೆಂಬರ್

ವಿಶೇಷತೆ: ಬರ ನಿರೋಧಕ, ಕಡಿಮೆ ಫಲವತ್ತತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾದ ಬೆಳೆ

ಇಳುವರಿ: ಏಕ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 2-2.5 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್‌ನಷ್ಟು ಕಾಳನ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.



ಸುಸ್ಥಿರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಬೀಜಗಳು

