



ಜಿಎಸ್‌ಎಸ್ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಪೀಠ, ಮೈಸೂರು

ಜಿಎಸ್‌ಎಸ್ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ

ಶೈತನಿಂಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಹಂಚುವ



ಕಾಡಿನಿಂದ ನಾಡಿಗೆ ಬಂದ

ಟೆಡ್‌ದ ನೆಲೆ

ಲೇಖಕರು : ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹೆಚ್. ಮಂಕಣಿ | ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಎಸ್. ಕಟ್ಟಮನಿ | ಜಮುನಾ ಅರಸ್ ಎನ್.

ಕಾಡಿನಿಂದ ನಾಡಿಗೆ ಬಂದ ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲೆ

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಲೆ ಕಾಂಟ ಪವಿತ್ರ ಮರವಾಗಿದ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲೆ 'ಸಿ' ಅನ್ನಾಂಗ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಔಷಧಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲೆ ಗೋಳಾಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ತೆಳು ಹಸಿರು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಾಗಿದ್ದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಣ್ಣುಗಳು ಒಗರು, ಕಹಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾರಿನಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ನೆಲ್ಲೆ ಕಾಂಟ ಯನ್ನು ತಾಜಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ವಿವಿಧ ತಿನಿಸುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಳಸಬಹುದು.



ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲೆಯು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ನೆಲ್ಲೆ ಕಾಂಟಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯಮ ಒಣ ಶುಷ್ಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗುಜರಾತ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಲೆ ಕಾಂಟ ಕೃಷಿ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮರವು 8 ರಿಂದ 18 ಅಡಿವರೆಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹರಡಿರುವ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಉಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾದರೂ ಜರುಸಾದ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಇದನ್ನು ಒಣಭೂಮಿ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ 600 ರಿಂದ 800 ಮಿ.ಮಿ ಮತ್ತು 18 ರಿಂದ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಉಷ್ಣಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲೆಯ ಔಷಧಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಆಸಕ್ತರು ಕೈತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಕುಟುಂಬದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನೆಲ್ಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬಳಸಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ, ನೆಲ್ಲೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇರುವುದರಿಂದ ರೈತರು ಅರ್ಥ ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಲೆಯನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲೆ ಬೆಳೆಯ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ಹವಾಗುಣ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು

ನೆಲ್ಲೆಕಾಂಟಯು ಸಮಶೀತೋಷ್ಣವಲಯದ ಸಸಿಯಾಗಿದೆ. ಬೆಳೆದ ನೆಲ್ಲೆಕಾಂಟ ಗಿಡವು ಅತಿಯಾದ ಹಿಮಪಾತ ಮತ್ತು 46 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್‌ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ತಾಳಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲದು. ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಉಷ್ಣಾಂಶವು ಹೂ ಜಡಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ-ಅಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರ್ಧತೆಯು ಸುಪ್ತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಫಲದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಒಣ ಹವೆಯಿಂದ ಫಲದ ಉದುರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಳವಾದ ಬೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕಡಿಮೆ ಎಲೆಯ ಪ್ರಮಾಣ, ಸುಪ್ತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಫಲಿತ ಮಿಡಗಳು (ಏಪ್ರಿಲ್-ಜೂನ್) ನೆಲ್ಲೆಕಾಂಟಯನ್ನು ಶುಷ್ಕ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಶುಷ್ಕ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಆಮ್ಲಿತ ಮತ್ತು ಕ್ಷಾರಿತವುಳ್ಳ (6.5-9.5) ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ನೆಲ್ಲೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ನೆಲ್ಲೆಕಾಂಟ ಬೆಳೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು ತೇವಾಂಶವುಳ್ಳ ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ತವಾದುದಲ್ಲ.

ಸಸ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬೇರು ಸಸ್ಯಗಳು



ನೆಲ್ಲಿ ಕಾಂಟು ಸಸಿಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಜೀಜ ಮತ್ತು ಕಸಿ ಕಟ್ಟುವಿಕೆಯಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀಜದಿಂದ ದೊರೆತ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಹಣ್ಣುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೇ ಗಾತ್ರ, ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀಜದಿಂದ ಬೆಳೆಸಿದ ಸಸಿಗಳು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ. ಜೀಜಗಳನ್ನು 'ಬೇರು ಸಸಿ'ಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ರೂಣವು ಸುಪ್ತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಬೇಗನೆ ಮೊಳಕೆಯೊಡುತ್ತದೆ. ಬೆಳೆದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಂಟು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಜನವರಿ-ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಒಣಗಿಸಿದ ನಂತರ ಅವುಗಳಿಂದ ಜೀಜಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಜೀಜಗಳನ್ನು ಎತ್ತರದ ಮಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟ್ರೇಗಳಲ್ಲಿ ಜತ್ತಬೇಕು. ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೊಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಸಿ ಮಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಸಿ ಮಾಡಲು ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೆಲ್ಲಿ ಕಾಂಟು ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಕಸಿ ಮಾಡುವ ಮೇಲ್ಕಾಂಡ (ಸಯಾನ್) ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಂಯೋಜನೆ ಕಸಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮವಲ್ಲ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಿಣ್ಣು ಕಸಿಯಿಂದ 60-100% ರಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ವಿ- ಅಕಾರದ ಕಸಿಯಿಂದ ಸಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕಸಿಕಟ್ಟಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ನೆಲ್ಲಿ ಕಾಂಟು ಮೇಲ್ಕಾಂಡವನ್ನು 5-6 ದಿವಸಗಳ ವರೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಬಹುದು. ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಗಿಣ್ಣು ಕಸಿಯು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಳಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾಣಿ

ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಉತ್ತಮ ಜಾತಿಯ ನೆಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳಿಂದ ಆಯ್ದ ಅನೇಕ ತಳಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬನಾರಸಿ, ಜಕ್ಕೆಯಾ, ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್, ಎನ್.ಎ-4,5,6,7 ಮತ್ತು 10, ಜಿಎಸ್.ಆರ್-1, ಕೃಷ್ಣಾ, ಕಾಂಜನ್ ತಳಿಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ.

ಬನಾರಸ: ಇದು ಜನಪ್ರಿಯ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ತಳಿಯಾಗಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಹಣ್ಣು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹಣ್ಣು ಮಧ್ಯಮ ನಾರು ಹೊಂದಿದ್ದು ಕ್ಯಾಂಡಿ ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಕೃಷ್ಣಾ: ಇದು ಬೇಗ ಕೊಯ್ಲುಗೆ ಬರುವ ತಳಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾಧಾರಣ ಗಾತ್ರ ಹೊಂದಿದ್ದು, ತಿರುಳು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ನುಣುಪಾಗಿದ್ದು, ಮೇಲ್ಮೈ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿದೆ. ಹಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚು ನಾರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ರಸ ಮತ್ತು ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು 'ಸಿ' ಜೀವಸತ್ವ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಕ್ಯಾಂಡಿ ಮಾಡಲು ಯೋಗ್ಯ ತಳಿಯಾಗಿದೆ.



ಚಕ್ರೆಯಾ: ಇದು ತಡವಾಗಿ ಕೊಂಬಿಗೆ ಬರುವ ತಳಿಯಾಗಿದ್ದು ಗಿಡವು ಹರಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯುತ್ತದಲ್ಲದೇ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ್ಣು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹಣ್ಣುಗಳು ಸಾಧಾರಣ ಗಾತ್ರದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಸಿಪ್ಪೆ ನುಣುಪಾಗಿದ್ದು ಹಳದಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮುಂತಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ತಳಿ.

ಕಾಂಚನ: ಚಕ್ರೆಯಾ ತಳಿಯಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಕಾಂಚನ ತಳಿಯು ಮಧ್ಯಮ ಅವಧಿಯ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ಕೊಡುವ ತಳಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹಣ್ಣುಗಳು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸಿಪ್ಪೆ ನುಣುಪಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ತಿರುಳು ನಾರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಜಿರುಸಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತ ತಳಿಯಾಗಿದೆ.

ಬಿ.ಎಸ್.ಆರ್.-1: ಈ ತಳಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ಕೊಡುವಂತಹದಾಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ಗಿಡವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 155 ಕೆ.ಜಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಗಿಡವು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದಿಂದಿದ್ದು, ಹರಡಬಲ್ಲ ಗುಣಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಿಡಗಳನ್ನು (6 X 6 ಮೀ) ನೆಡಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಹಣ್ಣುಗಳು ಗೊಂಚಲನಲ್ಲಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ್ದಾಗಿದೆ (97 ಗ್ರಾಂ). ಹಣ್ಣುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ತಿರುಳನ್ನು ಮತ್ತು 'ಸಿ' ಜೀವಸತ್ವವನ್ನು (610 ಮಿಲಿ ಗ್ರಾಂ/100ಗ್ರಾಂ) ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಫಿನಾಲ್ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಿಹಿ ಅಂಶ 18.1 ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ.

ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್: ಇದು ಚಕ್ರೆಯಾ ಎಂಬ ತಳಿಯಿಂದ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ದೊರಕಿದ ಸಸಿ. ಇದು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತಳಿಯಾಗಿದ್ದು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಹಣ್ಣನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ (40-45 ಗ್ರಾಂ). ಈ ತಳಿಯ ಹಣ್ಣು ಸಂಸ್ಕರಣೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಎನ್.ಎ.6: ಇದು ಚಕ್ರೆಯಾ ಎಂಬ ತಳಿಯಿಂದ ಅರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಎನ್.ಎ.7: ಇದು ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ತಳಿಯಿಂದ ಅರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತಳಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿವರ್ಷವು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾದ ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಣ್ಣುಗಳು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರವಾಗಿದ್ದು ಸರಾಸರಿ 45-50 ಗ್ರಾಂ ತೂಕವಿರುತ್ತದೆ, ವಿವಿಧ ತಿರುಳಿನ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ತಳಿಯಾಗಿದೆ.

ಎನ್. ಎ 10: ಇದು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತಳಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾದ ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಣ್ಣುಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದು ಸರಾಸರಿ 45-50ಗ್ರಾಂ ತೂಕವಿರುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ತಿರುಳಿನ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ತಳಿಯಾಗಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಜೀರ್ಣಕ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಕಸಿಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣು ಕಸಿ (ಬಿ-ಬ್ಲಾಂಡಿಂಗ್) ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಸಸಿ ಗಳನ್ನು 5ಮೀ. ಅಂತರದಲ್ಲಿ, 2 ಅಡಿ (ಉದ್ದ, ಅಳ ಮತ್ತು ಅಗಲದ) ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಂಪುಮಣ್ಣು, ಮರಳು ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿ ಗೊಬ್ಬರ ವನ್ನು 2:1:1 ರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ನೆಡಬೇಕು. ನಾಣಿ ಮಾಡಲು ಜೂನ್ ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಸೂಕ್ತ ಕಾಲ. 3 X 3 X 3 ಅಡಿ ಅಳತೆಯ ಗುಣಿ



ಗಲನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಗುಣಿಗಲನ್ನು ನಾಣಿ ಮಾಡುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲು 25 ರಿಲೋ ಕೋಣ್ಣಗೆ ಗೋಬ್ಬರ, 50 ಗ್ರಾಂ ರಂಜಕ ಮತ್ತು 50 ಗ್ರಾಂ ಪೋಷ್ಯಾಷ್ ಗೋಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಜೆನ್ನಾಗಿ ಢಿಶ್ರಣಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಸಿ ಮಾಡಿದ ಸಸಿಗಲನ್ನು ಗುಣಿಗಲ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲು ಕಸಿ ಕಣ್ಣಿದ ಜಾಗ ಭೂಢಿಯ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದಲ್ಲು ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ 25-30 ಅಲರ್ ನೀರನ್ನು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲು ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ.



ಗಿಡಗಲ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಗಿಡಗಲಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ 50 ಗ್ರಾಂ ಮೈಕೋರೈಜಾ, ತಲಾ 25 ಗ್ರಾಂ ಸಾರಜನಕ ಮತ್ತು ರಂಜಕ ಒದಗಿಸುವ ಜೈವಿಕ ಗೋಬ್ಬರಗಲನ್ನು ಒಂದು ಕೆ.ಜಿ ಁರೆಗೋಬ್ಬರದೊಡನೆ ಢಿಶ್ರಣಿಮಾಡಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕೊಡುವುದು. ನಾಣಿ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಮೂರು ವರ್ಷ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲು 15 ದಿನಗಲ ಅಂತರದಲ್ಲು ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಾಲು ಜಡುವಾಗ 15-20 ದಿನಗಲಗೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು. ಮಲೆಯಾಲ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶಗಲಲ್ಲು ಅರ್ಧಜಂದ್ರಾಕೃತಿಯ ಪಾತಿ ಮಾಡಿ ಅವುಗಲನ್ನು ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಲ ಹೊದಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತೇವಾಂಶ ರಕ್ಷಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲು ಗಿಡಗಲ ಸುತ್ತಲೂ ಕಲೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಹದಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬೆಳಿದ, ರೋಗಗಲಿಗೆ ತುತ್ತಾದ ಮತ್ತು ಒಣಗಿದ ನಿಶ್ಯಕ್ತ ಕೊಂಬೆಗಲನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಕೊನೆ ವಾರದಲ್ಲು ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆಯಬೇಕು.

ಸವರುವಿಕೆ : ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಮರದಲ್ಲು ಅಗಲ ಕೋನವುಳ್ಳ ಸದೃಢವಾದ 4-5 ಕೊಂಬೆಗಲನ್ನು ಜಟ್ಟು ಉಳಿದ ರೆಂಬೆಗಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ಒಣಗಿದ ನಿಶ್ಯಕ್ತ ಕೊಂಬೆಗಲನ್ನು ಸಹ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಕೊನೆ ವಾರದಲ್ಲು ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆಯಬೇಕು.

ಹೊದಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಂತರಬೇಸಾಯ: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲು ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲು ಅಥವಾ ಗೋಧಿಯ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಗಿಡಗಲ ಬುಡದಲ್ಲು 15-20 ಸೆಂ.ಢೀ ಎತ್ತರದವರೆಗೆ ಹೊದಿಸುವುದರಿಂದ ತೇವಾಂಶ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಕಲೆಗಲನ್ನು ಹತೋಣಿಯಲ್ಲುಡಬಹುದು. ಹೆಸರು, ಹುರುಳಿ ಅಥವಾ ಅಲಸಂದೆ ಬೆಲೆಗಲನ್ನು ನೆಲ್ಲ ತೋಟಗಲಲ್ಲು ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷಗಲ ತನಕ ಅಂತರ ಬೆಲೆಗಲಾಗಿ ಬೆಲೆಯಬಹುದು. ಔಷಧಿ ಬೆಲೆಗಲಾದ ಅಶ್ವಗಂಧ, ನೆಲಬೇವು ಹಾಗೂ ತುಲಸಿಯನ್ನು ಅಂತರ ಬೆಲೆಯಾಗಿ ಬೆಲೆಯಬಹುದು

ರೋಗ ಹಾಗೂ ರೀಟಗಲ ನಿಯಂತ್ರಣ

1) ಕಾಂಡ ಗಂಟು ಹುಳು: ಀ ರೀಟವು ಹೆಜ್ಜಾಗಿ ಸಸಿಗಲನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತದೆ, ಮರಿ ಹುಳುಗಲ ರೆಂಬೆಗಲನ್ನು ಕೊರೆಯುವುದರಿಂದ ಅಂತಕ ರೆಂಬೆಗಲು ಮುರಿದು ಜೀಳುತ್ತವೆ.

ಹತೋಟಿ ಕ್ರಮಗಲ: ಪ್ರತಿ ಅಲರ್ ನೀರಿಗೆ 4 ಗ್ರಾಂ ಕಾರ್ಬಲಿಲ್ ಅಥವಾ 1.5 ಮೀ.ಅಲ. ಮನೋಕ್ರೋಟೋಫಾಸ್ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.



2) ಹೇಸಿನ ಬಾಧೆ : ಹೇಸುಗಳು ಎಲೆ ಜಿಗುರು ಮತ್ತು ರೆಂಬೆಗಳಿಂದ ರಸ ಹೀರುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಇಂತಹ ರೆಂಬೆಯ ಭಾಗಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ನಂತರ ಒಣಗುತ್ತವೆ. ರೆಂಬೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಬೂದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಹ ಆಗಬಹುದು. ಹತೋಣಿ ಕ್ರಮಗಳು: ಪ್ರತಿ ಅೇರ್ ನೀರಿಗೆ 1.5 ಮಿ.ಅ. ಮನೋಕ್ರೋಟೋಫಾಸ್ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.

3) ತುಕ್ಕು ರೋಗ : ಎಲೆಗಳ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೂಜಿ ಮೊನೆಯಂತಹ ಕಿತ್ತಲೆ ಬಣ್ಣದ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕಂಡು ಬಾಬ್ದುಂತಾಗುತ್ತವೆ. ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿ ವರ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಬುದುರುತ್ತವೆ. ತೀವ್ರ ಬಾಧೆಯಾದಾಗ ಬೆಲೆಯುವ ಹಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೂ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಹತೋಣಿ ಕ್ರಮಗಳು : ರೋಗ ಬಾಧಿತ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಟ್ರಿಡಿಮಾರ್ಪ್ ಪ್ರತಿ ಅೇರ್ ನೀರಿಗೆ 1 ಮಿ.ಅ ಅಥವಾ 2 ಗ್ರಾಂ ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ ಪುಡಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಅೇರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು.

4) ಬೇರು ಕೊಚಿ ರೋಗ : ಗಿಡದ ಕೆಳಭಾಗದ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿ ವರ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಬುದುರುತ್ತವೆ. ಕಾಂಡವು ನಿಶ್ಲೇಷಿತವಾಗಿ ಗಿಡವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗುತ್ತವೆ. ಬೇರುಗಳು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ.

ಹತೋಣಿ ಕ್ರಮಗಳು : ರೋಗ ಬಾಧಿತ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಲಿನ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಅೇರ್ ನೀರಿಗೆ 2 ಗ್ರಾಂ ಕಾರ್ಬನ್‌ಡೈಜಮ್ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿದ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ತೊಯ್ಯುವಂತೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸುರಿಯಬೇಕು.

ಕೊಯ್ಲು ಮತ್ತು ಇಳುವರಿ : ನಾಣಿ ಮಾಡಿದ ಸುಮಾರು 4-5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕಸಿ ಗಿಡಗಳು ಕಾಂಬಿ ಜಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಕಾಂಬಿಗಳು ತಿಳಿಹಸಿರಿನಿಂದ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದಾಗ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಬೇಕು. ಸದೃಢವಾದ 10 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಮರದಿಂದ ಸುಮಾರು 50-70 ಕಿಲೋ ಗ್ರಾಂ ಕಾಂಬಿಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸರಾಸರಿ ಒಂದು ನೆಲ್ಲಾಕಾಂಬಿ ತೂಕ 60-70 ಗ್ರಾಂ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಕಿಲೋದಲ್ಲಿ 15-20 ಕಾಂಬಿಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಾ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 70 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.



ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕರು

ಜಿಎಸ್‌ಎಸ್ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ, ಸುತ್ತೂರು - 571 129

ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

ದೂರವಾಣಿ/ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 08221 232218, ಇಮೇಲ್ : jsskvk@gmail.com, ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ : www.jsskvk.org

ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಾಕಾಂಬಿ ಪ್ರಜಾರಾಂಡೋಲನ ಯೋಜನೆ

ಪ್ರಾಯೋಜಕರು : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಚಿಪ್ಪು ಗಿಡಮೂಲಕಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (KAMPA), ಬೆಂಗಳೂರು

ಸಂಯೋಜನೆ : ಭಾರತೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹೇಸರಫಟ್ಟ, ಬೆಂಗಳೂರು